

Link do produktu: <https://www.clarias.pl/fiprex-xl-fipronil-412-5-mg/5,5-ml-x-1szt-spot-on-na-kleszcze-wszy-i-pchly-dla-psa-p-41076.html>



Fiprex XL – Fipronil 412,5 mg/5,5 ml x 1szt SPOT ON - na kleszcze, wszy i pchły dla psa

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Fiprex XL
Kod producenta	5909997066707
Kod EAN	5909997066707
Producent	Fiprex

Opis produktu

Fiprex XL – Fipronil 412,5 mg/5,5 ml x 1szt. SPOT ON

Data ważności 21022023

Na kleszcze, wszy i pchły dla psa

Uwaga !!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, produkt jest dostępny do sprzedaży tylko w przypadku odbioru osobistego lub zlecenia odbioru w wybranej firmie kurierskiej. Produkty znajdujące się na liście OTC w tym Fiprex nie mogą być sprzedawane przez sklep do gabinetów weterynaryjnych oraz sklepów zoologicznych.

Fiprex® (spot on)

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Fiprex KOT – Fipronil 52,5 mg/0,7 ml;

Fiprex S – Fipronil 75 mg/1 ml;

Fiprex M – Fipronil 150 mg/2 ml;

Fiprex L – Fipronil 300 mg/4 ml;

Fiprex XL – Fipronil 412,5 mg/5,5 ml. (sprzedawany na tej aukcji)

WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Fiprex KOT: Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u kotów.

Fiprex S, M, L, XL: Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u psów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni.

Fiprex można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u szceniąt poniżej 8 tygodnia życia.

Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe.

Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji.

Nie stosować u królików.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W przypadku polizania przez zwierzę miejsca zastosowania preparatu, może wystąpić ślinotok, wymioty oraz inne objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, osowiałość). W miejscu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie futra, miejscowe wyłysienie, zaczerwienienie, świąd lub przetłuszczony wygląd. Działania niepożądane ustępują zwykle po 24 godzinach.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

Preparat podawać zewnętrznie, bezpośrednio na skórę. FIPREX KOT - 1 tubka 0,7 ml zawierająca 52,5 mg fipronilu - na kota, FIPREX S - 1 tubka 1 ml na psa do 10 kg; FIPREX M - 1 tubka 2 ml na psa od 10 do 20 kg; FIPREX L - 1 tubka 4 ml na psa od 20 do 40 kg, 2 tubki 4 ml na psa powyżej 55 kg; FIPREX XL - 1 tubka 5,5 ml na psa od 40 do 55 kg

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA:

Sposób podania: Nie kąpać zwierząt 2 dni przed oraz 2 dni po podaniu preparatu.

Fiprex KOT, S - Otworzyć tubkę przez przekręcenie i oderwanie końcówki. Rozchylić sierść między łopatkami i wycisnąć całą zawartość tubki bezpośrednio na skórę.

Fiprex M, L, XL - Otworzyć tubkę przez przekręcenie i oderwanie końcówki. Rozchylić sierść między łopatkami i wycisnąć całą zawartość tubki bezpośrednio na skórę - wzdłuż linii kręgosłupa aż do nasady ogona.

W celu uzyskania optymalnego efektu działania produkt należy podawać z zachowaniem minimum 4-tygodniowych odstępów pomiędzy kolejnymi aplikacjami. Należy zawsze mieć na uwadze aktualny stopień nasilenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie.

Preparat nie zabezpiecza przed przyцепieniem się kleszcza do skóry zwierzęcia. Po zabiciu kleszcze zazwyczaj spadają z sierści zwierzęcia, natomiast te, które pozostaną, mogą być usunięte przez delikatne strzepnięcie. W niekorzystnych warunkach po zastosowaniu preparatu mogą pozostawać na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym nie można całkowicie wykluczyć możliwości przenoszenia chorób zakaźnych.

Pchły występują również w miejscach, w których przebywają zwierzęta (legowiska, dywany).

Miejsca te również powinny być poddane działaniu odpowiednich preparatów przeciwpasożytniczych i regularnie odkurzane.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Zwierzęta: Zapobiegać lizaniu sierści przez zwierzęta kilka godzin po zabiegu. Nie stosować na uszkodzoną skórę zwierzęcia. Zwierzęta o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu nie powinny być poddawane zabiegowi. Wszystkie koty i psy przebywające w gospodarstwie domowym powinny również podlegać leczeniu.

Ludzie: Podczas zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić. Zaleca się podawać preparat w gumowych rękawiczkach ochronnych. Unikać kontaktu preparatu ze skórą. Po zabiegu dokładnie umyć ręce. Nie dotykać zwierzęcia aż do całkowitego wyschnięcia preparatu. W przypadku kontaktu preparatu ze śluzówką oka należy przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody. Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu powinny zachować szczególną ostrożność przy jego aplikacji.

Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Do podawania przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia.

www.fiprex.pl

Pozwolenie Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu nr:

1964/10 (KOT),
1965/10 (S),
1966/10 (M),
1967/10 (L),
1968/10 (XL)