

Link do produktu: <https://www.clarias.pl/katrinex-artemia-do-wylęgu-100g-suszone-jaja-solowca-p-16566.html>



## Katrinex ARTEMIA DO WYLĘGU 100G - SUSZONE JAJA SOLOWCA

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena             | <b>63,18 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki     | <b>24h robocze</b>            |
| Numer katalogowy | <b>ARTEMIA DO WYLĘGU 100G</b> |
| Kod producenta   | <b>5902003018059</b>          |
| Kod EAN          | <b>5902003018059</b>          |
| Producent        | <b>KATRINEX</b>               |

### Opis produktu

#### Katrinex ARTEMIA DO WYLĘGU 100G - SUSZONE JAJA SOLOWCA

Bardzo popularny pokarm stosowany do wylęgu i odchovu narybku. Występuje w postaci drobnego piasku. Polecany dla hodowców ryb. przeznaczony do bezpośredniego skarmiania. Pokarm bardzo wartościowy przy rozmnażaniu ryb.

#### POKARMY SUSZONE / ARTEMIA (SOLOWIEC)

ARTEMIA nazywana inaczej "SOLOWIEC" w postaci "do INKUBACJI" (do wylęgu) to bardzo drobny pokarm, który z powodzeniem nadaje się do skarmiania narybku.

#### INKUBACJA

W celu przeprowadzenia prawidłowego procesu inkubacji należy:

Przygotować roztwór inkubacyjny z wykorzystaniem wody morskiej lub bieżącej (słodkiej) z dodatkiem soli niejodowanej (chlorek sodu). Zawartość soli nie powinna przekraczać 30ppt, co w praktyce oznacza 3 łyżki stołowe soli na 3 litry wody

Zalecany poziom pH 8.0-8.5, w celu zwiększenia pH wykorzystać NaHCO<sub>3</sub> (wodorowęglan sodu) w ilości 2g na 1L wody

W celu polepszenia wylęgu dodawać 4-5 kropli wody utlenionej lub perhydrolu na 1L wody – zalecane przy małej inkubacji

Solowca dokładnie wymieszać z aktywatorem i bez wcześniejszego przewietrzania wprowadzić cysty w ilości 2g na 1L wody

W procesie inkubacyjnym wykorzystywać stałą aerację powietrzem w celu utrzymywania cyst w stanie zawiesiny – przepustowość 5-6L/min

Roztwór inkubacyjny utrzymywać w temperaturze 28-30°C

Zapewnić stałe oświetlenie – nie mniej niż 2000lux

Czas inkubacji – min. 24h

Zaleca się wykorzystywać do wylęgu pojemnik z dnem w formie stożka

Po zakończeniu wylęgu odłączyć aerację, oddzielić naulupie (naupliusy), wykorzystując cienki filtr, przed skarmieniem przemyć pod bieżącą wodą

#### WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Czysty przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, w temperaturze poniżej 10°C, zakrytym przed promieniami

słonecznymi  
Po otwarciu szczelnie zabezpieczyć przed dostępem powietrza